

中山醫學大學附設醫院用藥指導單張

中文名：**利保維源注射劑**
4ml/vial(F)

仿單

[連結](#)

英文品名：**Lyo-Povigent inj.**
4ml/vial(需冷藏)(2劑混合)

學名劑量：**VIT.(A,D,E,K),VIT.B(1,2,3,5,6,7,9,12),VIT.C**

**臨床用途：**

不能經口、腸道，依賴靜脈營養之維他命補給

**主要副作用：**

發疹、噁心、腹痛

A. 為確保疾病能有效控制,有時藥品引起之副作用可能無法避免,若您有以上症狀發生且無法忍受時,請告知醫師,由醫師評估後再作調整。

B. 若您在用藥後發生嚴重藥物過敏(蕁麻疹、眼睛及嘴巴周圍腫脹或刺痛、皮膚搔癢、胸痛、喘、呼吸困難)請立即(盡速)就醫。

**用藥須知：**

如果您預備懷孕或已經懷孕或需餵哺母乳，請注意本品懷孕分級：N 級，無資料，請謹慎使用。

**如何正確用藥：**

門診搭配SmofKabiven、Oliclinome不發，TPN給

將Amp(水性注射液)注入Vial(凍晶粉末)溶解混合均勻，2劑混合須加入NS 500mL中滴注。

**如何保存藥品：**

須冷藏(2~8°C)，避光貯存。

A. 請將藥品保存於原包裝中，避免放在兒童可以拿到的地方。 B. 過期藥品應即丟棄，並確定不會被小孩拿到誤食。

藥品外觀

劑型

針劑

圖片



藥品查詢



此指導單張未包含本藥品所有資訊，若您有疑問，請詢問您的醫師或藥師