中山醫學大學附設醫院用藥指導單張

中文名： **歐得通錠２５公絲**

藥品資訊

英文品名： **◆Spironolactone "ROYAL" 25mg/tab**

學名劑量： **Spironolactone 25mg/tab**

臨床用途:

利尿、高血壓

主要副作用:

頭痛、倦睡、斑丘疹、乳房腫大、高血鉀症、心臟搏動不規則

A.為確保疾病能有效控制,有時藥品引起之副作用可能無法避免,若您有以上症狀且無法忍受時,請告知醫師,由醫師評估後再作調整。

B.若您在用藥後發生嚴重藥物過敏 (蕁麻疹、眼睛及嘴巴周圍腫脹或刺痛、皮膚搔癢、胸痛、喘、呼吸困難)請立即(盡速)就醫 。

C.留意7要點降低跌倒風險:

1.服藥前後、睡前先如廁，減少夜間起床如廁的次數。

2.無法久站或行走者可使用活動馬桶、床旁便器以避免危險，注意須確定其固定妥當後再使用。

3.起身、下床前，先坐於床緣約3～5分鐘，再站在床邊3～5分鐘，確定沒有肌肉無力或暈眩狀況，再開始走動。

4.安全的環境：減少雜物、維持環境整潔、動線順暢，光線保持明亮。

5.穿著適當大小的衣褲、防滑鞋。

6.若是住院或臥床病人，照顧者離開床邊時，應將呼叫鈴、衛生紙等必要用品置於病人隨手可得的床邊桌，並拉起護欄、主動告知護理人員或其他陪伴家屬。

7.行走不便長者，建議使用拐杖、助行器等輔具。

用藥須知:

A.如果您有以下情形請勿使用:

對spironolactone過敏者

高血鉀症的患者不可服用本藥

B.如果您預備懷孕或已經懷孕或需餵哺母乳，請注意本品懷孕分級:D 級 ,已證實對人之胎兒有傷害，若是疾病對於孕婦有生命威脅或安全的藥品已無法治療的情況下，權衡利弊，仍可使用。餵哺母乳:安全性未確定，但本品活性代謝物會排泄至乳汁。

如何正確用藥:

與留鉀製劑或鉀製劑併服時需注意。

忘記用藥時怎麼辦？

若剛過用藥時間點，趕快使用，若已快到下個使用時間點，則不補用，千萬不要使用兩倍劑量。

如何保存藥品:

A.使用期限請參考藥品原包裝或藥袋標示，未標示則一般效期為開方期限後三個月內。

B.請將藥品保存於原包裝中，避免放在兒童可以拿到的地方。藥品應置於陰涼乾燥處，並避免陽光直射。不要放在曝曬的汽車內。

C.除特別指示外，不必置於冰箱保存。放冰箱藥品，除非特別指示不可冷凍。

D.過期藥品應即丟棄，並確定不會被小孩拿到誤食。

藥品外觀

劑型 口服

分類 C03 利尿劑

圖片



進一步詢問:

此指導單張未包含本藥品所有資訊，若您有疑問，請詢問您的醫師或藥師

0 **0**