中山醫學大學附設醫院用藥指導單張

中文名： **祐坦賜福乾粉注射劑** 藥品資訊

英文品名： **Tatumcef 0.5g/vial**

學名劑量： **Ceftazidime 0.5gm inj**

臨床用途:

殺菌性頭孢子菌抗生素、並對廣範的革蘭氏陽性及陰性的細菌有效

主要副作用:

注射部位疼痛、靜脈炎、腹瀉、過敏反應

A.為確保疾病能有效控制,有時藥品引起之副作用可能無法避免,若您有以上症狀且無法忍受時,請告知醫師,由醫師評估後再作調整。

B.若您在用藥後發生嚴重藥物過敏 (蕁麻疹、眼睛及嘴巴周圍腫脹或刺痛、皮膚搔癢、胸痛、喘、呼吸困難)請立即(盡速)就醫 。

用藥須知:

A.如果您有以下情形請勿使用:

對頭孢子菌抗生素過敏者禁用

B.如果您預備懷孕或已經懷孕或需餵哺母乳，請注意本品懷孕分級:B 級 ,以動物做試驗，無法證明對胎兒有害，且沒有以人做較嚴謹的研究。或動物試驗報告對胎兒有害，但針對懷孕婦女有對照組的研究中無法證明對胎兒有害。餵哺母乳:自人乳中排出微量，因此使用於哺乳中的母親時須小心注意。

如何正確用藥:

在開始治療之前應先確定患者是否曾對Ceftazidime，Cephalosporins，Penicillin類或其他藥物有過敏反應。
IVD: >30分鐘。（延長輸注 > 3-4 小時）或（連續輸注 > 24 小時）。
IVP: 3-5分鐘 。
IM: 深層肌肉注射。
配製液:IM 0.5g with1.5ml W;IV 0.5g with 5ml W; 1 g with 10 ml W。
稀釋液:50ml NS or D5W。
濃度在 1mg/ml 及40mg/ml 之間的 Ceftazidime 可與下列輸注液配合：
NS、D5W、D10W、Hartmann's(LR) inj 500ml

如何保存藥品:

稀釋:室溫 18hr/冷藏 7天
A.請將藥品保存於原包裝中，避免放在兒童可以拿到的地方。B.過期藥品應即丟棄，並確定不會被小孩拿到誤食。

藥品外觀

劑型 針劑　　分類 J01 抗生素

圖片



進一步詢問:

此指導單張未包含本藥品所有資訊，若您有疑問，請詢問您的醫師或藥師

0　　0

0

0